

| | | |
|--|------|---------------------|
| <div style="text-align: center;"> <p>殺菌・消毒に</p> <p><small>日本薬局方</small></p> <p>消毒用 エタノール</p> <p>殺菌消毒剤</p> <p>Ethanol for Disinfection</p> <p><small>火気厳禁 第4類アルコール類 危険等級II</small> 500mL</p> </div> | 区分 | 第3類医薬品 |
| | 薬効分類 | 外用殺菌消毒薬 |
| | 剤形 | 外用液剤 |
| | 包装規格 | 500mL |
| | 備考 | 第4類アルコール類 危険等級II |

使用上の注意

してはいけないこと（守らないと現状の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）
次の部位には使用しないでください。
粘膜（口唇等）、目の周囲

相談すること

- 次の人は、使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 本人または家族がアレルギー体質の人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 患部が広範囲の人
 - 深い傷やひどいやけどの人
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
 - 使用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症状 |
|------|------------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ、灼熱感 |
 - 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

【効能効果】

創傷面の殺菌、消毒

【用法用量】

本液を脱脂綿、ガーゼ等に浸して患部に軽く塗る。

<用法用量に関連する注意>

- 用法用量を守ってください。
- 局所刺激作用があるので、軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないでください。
- 過度に使用した場合、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
- 広範囲または長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療をうけてください。
- 外用にのみ使用してください。

【成分分量】

エタノール(C₂H₆O) 76.9～81.4vol% を含有

【保管および取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）
- 火気に近づけないでください。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- 開封時、容器の肩部または底部を持ち、液がとびださないように、キャップを開けてください。
- 薬剤が衣類、あるいは、床や家具等に付着しないようにしてください。（変質または変色のおそれがあります。）